

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA.

El preparado se administra por vía oral con agua potable de forma individual o grupal en las siguientes dosis:

ESPECIES ANIMALES	DOSIS	DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
Terneros, corderos, cabritos a partir de 2 semanas.	0,3 ml/kg de peso corporal	Administración única
Lechones de 3-5 días de vida	0,4 ml/kg de peso corporal (no menos de 1,5 ml ni más de 2 ml por animal)	
Conejos a partir de 4 semanas.	0,14 ml/kg de peso corporal	
Aves de corral	0,5 ml / 1 L de agua potable (administrar durante 48 horas) o 1,5 ml / 1 L de agua de bebida (administrar durante 8 horas al día)	2 días

Durante el tratamiento, el agua medicada debe ser la única fuente de agua potable para las aves. En caso grave de enfermedad, si es necesario, repetir el tratamiento a los 5 días. Para maximizar el efecto preventivo y reducir la excreción de ooquistes al medio ambiente, especialmente en granjas dañadas por coccidiosis, el producto debe administrarse antes de que aparezcan los primeros signos de la enfermedad.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 77 días (lechones), 63 días (terneros), 70 días (conejos), 14 días (aves de corral) después del último tratamiento.

VIDA PROPIA

24 meses. Después de la primera apertura – 14 días si se almacena en un lugar oscuro entre +5 y +25° C.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Almacenar en lugares secos y oscuros, fuera del alcance de los niños entre +5 y +25° C.