

CURAMICINA DORADA L.A.

Solución Inyectable

Antibiótico + antiinflamatorio

N° Registro: F.71.01.N.0013

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina	20 g
Diclofenaco sódico	0.5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

USO EN:

Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

INDICACIONES DE USO:

Carbunco Bacteriano, Carbunco sintomático, Anaplasmosis, Ántrax, Edema maligno, Septicemias hemorrágicas, Neumonías, Fiebre de transporte, Mastitis, Leptospirosis, Pедера, Metritis, Bronquitis, Abscesos, infecciones genitourinarios y como tratamiento pre y post operatorio en bovinos, ovinos, caprinos y camélidos sudamericanos.

DOSIFICACIÓN

1 ml por cada 10 kg de peso vivo.

Las dosis se adjuntan de acuerdo al criterio de Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO

- No administrar a animales de leche para consumo humano.

PRECAUCIONES QUE DEBEN ADOPTARSE ANTES, DURANTE O DESPUÉS DE SU USO

- Usar jeringas limpias preferibles descartables.
- Romper el envase para evitar que lo vuelvan a usar.
- Eliminar las jeringas descartables usadas.

PERIODO DE RETIRO

Carne: 28 días.

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Almacenar en lugar fresco y seco entre 15 y 30°C
- Proteger de la humedad y la luz solar.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.