

MOLUX® 6 GB



MOLUX® 6 GB es un molusquicida de ingestión y contacto. Para el control de babosas y caracoles.

NOMBRE COMÚN: Metaldehído(2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacyclo-octane).

GRUPO QUÍMICO: Aldehidoscíclicos.

FORMULACIÓN: **MOLUX® 6 GB** está formulado como cebo granulado.

CONCENTRACIÓN: Contiene 60 gramos de ingrediente activo por kilo de producto formulado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

Peso molecular: 176.2.

Estado físico: granulado.

Olor: suave a aldehído.

Tensión de vapor a 25 °C: 0,0495 ± 0,00225 mm Hg (6,6 ± 0,3 Pa).
Coeficiente de partición (n-octanol/agua) a 20 °C: log P 0,12.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica III - Ligeramente Peligroso.

ACTIVIDAD: **MOLUX® 6 GB** tiene actividad por ingestión y contacto. La actividad por contacto es más rápida que por ingestión. Su contacto con el cuerpo induce una secreción creciente de mocos que entorpece los movimientos del molusco y lo deshidrata rápida e irreversiblemente. Tiene notable actividad insecticida contra ortópteros (alcarrán cebollero, saltamontes, etc.) y dermápteros (tijeretas, etc.).

RECOMENDACIONES DE USO: El matababosa **MOLUX® 6 GB**, es un producto que viene formulado en CEBO, listo para ser esparcido en el suelo.

Los productos anti-babosa deberán ser aplicados preferente mente al final de la tarde, en lo posible después de una fuerte lluvia, ya que las babosas salen de sus refugios por la tarde o noche.

MOLUX® 6 GB no es fitotóxico si se usa siguiendo las recomendaciones. No debe permitirse que toque la superficie de las hojas de los cultivos ya que puede causar daños. Los mejores resultados se obtienen cuando se aplica **MOLUX® 6 GB** con tiempo suave y húmedo, cuando las babosas y caracoles están más activos.

No aplicar **MOLUX® 6 GB** si amenaza lluvia ni regar las plantas de invernadero dentro de los 4 días después de la aplicación.

DOSIFICACIÓN DE MOLUX® 6 GB:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS
HORTALIZAS: Col (<i>Brassica oleracea</i> Var. Capitata Subvar. alba), Coliflor (<i>Brassica oleracea</i> Var. Botrytis Subvar. cauliflora). Lechuga (<i>Lactuca sativa</i>) Cebolla (<i>Allium cepa</i> , <i>Allium fistulosum</i>) y otras Papa (<i>Solanum tuberosum</i>) Tomate (<i>Lycopersicon esculentum</i>)	Babosas <i>Deroceras reticulatum</i> , <i>Milax gagates</i> Caracoles <i>Helix aspersa</i>	Esparcir 25 cebos por metro cuadrado (m²) o 4.0 kilogramos por hectárea.
FRUTALES: Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>) Manzano (<i>Malus communis</i>) Peral (<i>Pyrus communis</i>)		
ORNAMENTALES: Rosal (<i>Rosa</i> sp.) Clavel (<i>Dianthus caryophyllus</i>) Crisantemo (<i>Chrysanthemum morifolium</i>)		
ARROZ (<i>Oryza sativa</i>)	Caracol Manzana (<i>Pomacea canaliculata</i>)	3.0 kilogramos por hectárea

MOLUX® 6 GB debe ser aplicados al final de la tarde, en lo posible después de presentarse la lluvia. Por no tener contacto directo con las plantas, puede aplicarse inclusive al momento de la cosecha.

COMPATIBILIDAD: El producto es un cebo granulado, por lo tanto se aplica solo.

PRECAUCIONES DE MANEJO: Este producto puede ser mortal si se ingiere. Venenoso si se inhala. Puede ocasionar daño a los ojos. DURANTE la preparación y utilización del producto. NO COMER, BEBER O FUMAR.

EVITAR, inhalar los vapores y todo tipo de contacto con la piel. USAR, guantes y ropa protectora durante la aplicación del cebo.

ANTES DE COMER-BEBER O FUMAR, SACARSE LA ROPA CONTAMINADA, LAVARSE MUY BIEN LAS PARTES EXPUESTAS DE LA PIEL CON ABUNDANTE AGUA.

FRASES DE ADVERTENCIA:

- No almacenar en casa de habitación, tampoco junto con alimentos, bebidas o medicamento para uso humano o animal.
- Guárdese en un lugar seco, fresco y con buena ventilación.
- De baja toxicidad para lombrices de tierra.
- Destruya el envase después de usar el producto. Elimínelo en un lugar seguro.
- No contaminar cuerpos de agua como: acequias, canales, ríos, lagunas y otros.

INSTRUCCIONES PARA PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

En caso de intoxicación accidental por: Ingestión, provoque el vómito, siempre y cuando el paciente este consciente, preferible administrar lavado gástrico. Contacto, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Los ojos, lavar con abundante agua. Inhalación, retirar al paciente a un lugar seco con buena ventilación y fresco, lejos del calor.

CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.

PRESENTACIONES:

Funda x 500 g.

Funda x 1 kg.

Funda x 5 kg.

Funda x 25 kg.

REGISTRO AGROCALIDAD N°: 021-V2-SESA-U

FABRICADO POR: FORAGRO S.A.

DISTRIBUIDO POR: FEBRES CORDERO COMPAÑÍA DE COMERCIO S.A. (AFECOR).