



AGRO KREBS
SOLUCIONES PARA UN CAMPO MÁS PRODUCTIVO

VIO CA

INFORMACIÓN GENERAL

VIO CA es un fertilizante hidrosoluble a base de calcio de alta asimilación, que contiene estructuras moleculares que ayudan a mejorar la resistencia para todo tipo de cultivo. Promueve un mejor desarrollo y forma de los frutos, mayor turgencia, consistencia y una mayor vida de anaquel, además de proteger a las plantas de múltiples patógenos. La absorción de VIO CA por las plantas es pasiva y no requiere una fuente de energía. VIO CA se transporta por la planta principalmente a través del xilema, junto con el agua por lo tanto la absorción de VIO CA está directamente relacionada con la proporción de transpiración de la planta.

BENEFICIOS

Toma parte en la regulación osmótica. Participa en los procesos enzimáticos y hormonales. Fortalece la pared celular formando pectatos de calcio que dan estabilidad a las paredes celulares. Participa en la inducción de proteínas de choque térmico. Ayuda a proteger las plantas contra enfermedades, hongos y bacterias. Incrementa la vida de anaquel de los frutos.

CARACTERÍSTICAS

FÍSICAS

FORMA	Escamas Hidrosolubles
COLOR	Blanco
OLOR	Característico
CORROSIVIDAD	No corrosivo
INFLAMABLE	No flammable

QUÍMICAS

PH	6 – 7 a 25°
DENSIDAD	1 Kg
SOLUBILIDAD	TOTALMENTE SOLUBLE EN AGUA
COMPATIBILIDAD	TOTALMENTE COMPATIBLE

GENERALES

TIEMPO DE REENTRADA	Totalmente biodegradable
ALMACENAMIENTO	No es residual ya que es un nutriente
TOXICIDAD	Ligeramente tóxico



PRESENTACIONES DISPONIBLES

1 Kg



AGRO KREBS
SOLUCIONES PARA UN CAMPO MÁS PRODUCTIVO

ANÁLISIS GARANTIZADO

ELEMENTO	% P/P
Calcio (CaO) Quelatado-EDTA	23.0%
Ácidos Fúlvicos	1.0%
Inertes	76.0%
Total	100.0%

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS kg/Ha	RECOMENDACIÓN
Frutales	4 a 6	Cítricos, manzanos, aguacate y mangos. Aplicar al inicio de las etapas de floración, cada aplicación con intervalos de 20 días.
Hortalizas	1 a 2	Cebollas, tomates, chile, calabacita. Aplicar en intervalos de 15 a 20 días durante el desarrollo.
Flores de corte	1 a 2	Rosas, claveles y gerberas. Aplicar con intervalos de 15 a 20 días.
Papaya	1 a 3	Aplicación semanal dirigido al fruto.

FORMAS DE APLICACIÓN

VIO CA se recomienda aplicar para todo tipo de cultivo y su aplicación puede ser vía foliar o dirigida al suelo.